

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran klinikopatologi kanker tiroid di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2018 - 2020, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Distribusi frekuensi karakteristik penderita kanker tiroid terbanyak ditemukan pada kelompok usia 55 – 64 tahun (34,3%), perempuan (60%), IMT normal (48,6%) dan sebagian besar tidak memiliki riwayat keluarga yang menderita kanker (97,1%).
2. Distribusi frekuensi penderita kanker tiroid berdasarkan jumlah nodul tiroid tertinggi adalah *single* nodul memiliki jumlah tertinggi yaitu 60%.
3. Distribusi frekuensi penderita kanker tiroid berdasarkan ukuran nodul tiroid paling banyak dijumpai pada ukuran > 4 cm yaitu 48,6%.
4. Distribusi frekuensi penderita kanker tiroid berdasarkan konsistensi nodul tiroid paling umum ditemukan adalah solid 74,3%.
5. Distribusi frekuensi penderita kanker tiroid berdasarkan jenis histopatologi tertinggi adalah kanker tiroid tipe papiler dengan persentase 80%.
6. Distribusi frekuensi penderita kanker tiroid berdasarkan tatalaksana pembedahan tertinggi adalah total tiroidektomi 65,7%.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang, maka dapat disarankan:

1. Sebaiknya penelitian epidemiologis dari kanker tiroid dapat terus dilakukan sehingga dapat memberikan informasi mengenai pola serta perkembangan karakteristik dari kanker tiroid kedepannya.
2. Penelitian selanjutnya mengenai gambaran klinikopatologi kanker tiroid sebaiknya tidak hanya dilakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang saja, namun di berbagai lokasi rumah sakit yang berbeda sekaligus.