

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Antibiotik terbanyak yang digunakan di rawat inap Obstetri-Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang pada bulan Oktober-Desember tahun 2018 adalah seftriakson. Penggunaan antibiotik yang digunakan secara kombinasi yang paling banyak adalah seftriakson-metronidazol intravena.
2. Kuantitas penggunaan antibiotik terbanyak di rawat inap Obstetri-Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang pada bulan Oktober-Desember tahun 2018 berdasarkan *Define Daily Dose* (DDD) adalah seftriakson.

6.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini merupakan studi awal dalam evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien rawat inap Obstetri-Ginekologi RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2018. Analisis ini penting dilakukan sebagai bagian upaya pencegahan dan penanggulangan resistensi antibiotik pada lingkungan rumah sakit. Perlu dilakukan analisis kualitatif terhadap penggunaan antibiotik untuk melihat keefektifan dan kesesuaian penggunaan antibiotik dari berbagai faktor.
2. Bagi instansi
Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit dan menjadi masukan bagi kebijakan penggunaan antibiotik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terbaik di RSUP Dr. M Djamil Padang dan dapat menjadi evaluasi bagi program pengendalian resistensi antibiotik di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai penggunaan antibiotik di RSUP Dr. M. Djamil Padang terutama penggunaan antibiotik profilaksis harus mempertimbangkan data uji sensitivitas antibiotik.