

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada saat akhir pemberian level serat kasar sampai 16% dalam ransum mempengaruhi persentase bobot ventrikulus, persentase panjang jejunum, ileum dan tebal usus halus. Setelah akhir masa pemulihan dengan serat kasar 8% mempengaruhi tebal usus halus serta tidak mempengaruhi persentase bobot ventrikulus, persentase panjang usus halus, dan lemak abdomen. Dapat disimpulkan bahwa pemberian level serat kasar 16% dan dilanjutkan masa pemulihan pada entok tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata terhadap persentase bobot ventrikulus 3,889% bobot hidup, persentase panjang duodenum 1,76% bobot hidup, jejunum 4,79% bobot hidup, ileum 5,04% bobot hidup, tebal usus halus 0,307 g/cm dan persentase lemak abdomen paling sedikit yaitu 2,30%.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan pada pemeliharaan Entok, Pemberian level serat kasar hingga 16% selama 3 minggu dan dilanjutkan dengan masa pemulihan selama 5 minggu masih dapat ditolerir oleh entok sehingga dapat digunakan sebagai campuran pada pakan.