

## **BAB 7 KESIMPULAN**

### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan nilai estimasi laju filtrasi glomerulus dengan kadar asam urat serum pada pasien penyakit ginjal kronis non HD di RSUP DR. M. Djamil Padang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Lebih dari separuh penderita PGK non HD terbanyak adalah laki-laki (53,30%) dan usia 50 - 60 tahun (63,30%).
2. Nilai rerata eLFG pasien PGK non HD adalah  $23,47 \pm 2,382$  ml/menit.
3. Nilai rerata asam urat pasien PGK non HD adalah  $8,733 \pm 0,322$  mg/dl.
4. Terdapat korelasi kuat nilai eLFG dengan kadar asam urat serum pada pasien PGK non HD dengan arah korelasi negatif dan bermakna secara statistik.

### **7.2 Saran**

1. Dapat melanjutkan penelitian selanjutnya pada lokasi yang berbeda dan dengan jumlah sampel yang lebih besar agar penelitian mengenai hubungan laju filtrasi glomerulus dengan kadar asam urat pada pasien PGK lebih valid karena jumlah sampel yang lebih besar dapat mewakili populasi yang lebih luas.
2. Dalam rekam medis diharapkan ditulis secara lengkap dan jelas terutama dalam bagian anamnesis riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, serta riwayat minum obat.
3. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap terkait asam urat dan kreatinin pasien agar bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya.