

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Pada penelitian ini, epilepsi banyak terjadi pada laki-laki, usia 1-5 tahun. Jenis kejang yang banyak terjadi adalah kejang umum.
2. Pada penelitian ini, lebih dari separuh pasien epilepsi anak mengalami remisi 6 bulan dan 12 bulan.
3. Kejadian remisi 6 bulan dan 12 bulan lebih banyak terjadi pada skor ≥ 384 pada *The Nova Scotia Scoring System* yang dimodifikasi, namun tidak bermakna secara statistic.
4. Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan bermakna antara faktor-faktor yang mempengaruhi remisi epilepsi antara lain jenis kelamin, usia pertama kejang, jenis kejang, riwayat kejang neonatus, jumlah kejang sebelum pengobatan dengan kejadian remisi pada epilepsi anak.

7.2. Saran

1. Penilaian remisi dilakukan saat awal diagnosis dengan *The Nova Scotia Scoring System*
2. Penilaian tingkat inteligensi dilakukan saat awal diagnosis epilepsi.
3. Penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi remisi epilepsi dengan kohort dalam rentang waktu yang lebih lama.