

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

#### **1.1 7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan merokok dengan eksaserbasi PPOK di RSUP Dr. M. Djamil Padang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prevalensi pasien eksaserbasi terbanyak adalah bekas perokok dengan derajat merokok yang paling banyak ditemukan adalah derajat berat. Tipe eksaserbasi yang paling sering adalah tipe berat. Komorbid yang paling umum ditemukan adalah pneumonia komunitas.
2. Tidak terdapat hubungan antara status merokok dengan eksaserbasi PPOK.
3. Tidak terdapat hubungan antara derajat merokok dengan eksaserbasi PPOK.
4. Terdapat hubungan antara jumlah serangan terhadap merokok dan tidak merokok
5. Tidak terdapat hubungan antara antara komorbid dengan aktifitas merokok

#### **7.2 Saran**

1. dilakukan penelitian dengan data primer agar variabel perancu dapat diteliti sebagai penentu bias
2. Bagi peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengganti tempat penelitian seperti faskes tingkat satu atau dua agar penyebaran data lebih merata.

