

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Angka kejadian ESO yang disebabkan oleh penggunaan kaptopril pada pasien hipertensi di Puskesmas Andalas Kota Padang adalah sebanyak 22 pasien (50%) dari 44 pasien yang termasuk dalam kriteria inklusi penelitian ini.
2. Klasifikasi ESO berdasarkan Algoritma Naranjo yang dialami oleh pasien hipertensi yang menggunakan kaptopril ada probable sebanyak 19 kasus (73%) dan possible sebanyak 7 kasus (27%).
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik sosiodemografi (usia dan jenis kelamin) dengan kejadian ESO pada pasien hipertensi yang menggunakan kaptopril di Puskesmas Andalas Kota Padang.
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola pengobatan kaptopril dengan kejadian ESO pada pasien hipertensi yang menggunakan kaptopril di Puskesmas Andalas Kota Padang.

5.2 Saran

1. Dalam melakukan penelitian mengenai efek samping obat menggunakan instrumen Algoritma Naranjo sebaiknya bekerjasama dengan tenaga kesehatan (dokter) agar dapat melakukan intervensi kepada pasien untuk mengetahui kejadian efek samping yang lebih aktual.
2. Untuk memastikan lebih lanjut mengenai efek samping yang dialami pada pasien yang menerima pengobatan kaptopril kombinasi dengan obat lain diperlukan kajian yang lebih komprehensif.