

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak adanya interaksi pemberian *cocopeat* dan mol bonggol pisang terhadap tinggi bibit, jumlah daun, panjang daun, diameter batang, luas daun, volume akar, dan rasio tajuk akar.
2. Dosis komposisi pemberian *cocopeat* yang terbaik adalah 150 g/polybag untuk menunjang pertumbuhan bibit kakao. Berpengaruh terhadap diameter batang, jumlah daun, volume akar dan rasio tajuk akar.
3. Dosis pemberian mol bonggol pisang yang terbaik adalah 350 ml untuk menunjang pertumbuhan bibit kakao. Berpengaruh terhadap diameter batang, volume akar dan rasio tajuk akar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disarankan penggunaan *cocopeat* dan mol bonggol pisang adalah 150 g/ polybag dan 350 ml untuk menunjang pertumbuhan bibit kakao. Apabila ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh *cocopeat* dan Mol bonggol pisang, disarankan pada pembibitan tanaman perkebunan lainnya.