

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin, usia, domisili, pekerjaan dan tingkat pendidikan pada pasien skizofrenia paranoid dengan nilai selisih PANSS-EC. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan lama hari rawatan dengan *p-value* 0,036. Sedangkan, antara usia domisili, pekerjaan dan tingkat pendidikan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan lama hari rawatan.
2. Berdasarkan lama hari rawatan risperidon-olanzapin memiliki efektifitas yang rendah tetapi biaya yang tinggi daripada risperidon (terletak pada kuadran IV), dengan nilai RIEBnya adalah – Rp. 59.906,219. Sedangkan, berdasarkan selisih skor PANSS-EC risperidon-olanzapin memiliki efektifitas yang tinggi dan juga biaya yang tinggi daripada risperidon (terletak pada kuadran I), dengan nilai RIEBnya adalah Rp. 164.023,551.

5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengambilan data secara prospektif untuk mendapatkan skor PANSS sampai pasien sembuh.

