

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Median kadar hemoglobin sebelum aferesis trombosit adalah 15,4 (12,6 - 16,4) g/dL dan setelah prosedur aferesis trombosit 14,9 (12,0 - 16,0) g/dL.
2. Median jumlah trombosit sebelum aferesis trombosit adalah 257.000 (228.000 - 365.000)/mm³ dan setelah prosedur aferesis trombosit 177.000 (116.000 - 324.000)/mm³.
3. Median kadar kalsium sebelum aferesis trombosit adalah 9,20 (7,90 - 10,60) ± mg/dL dan setelah prosedur aferesis trombosit 9,15 (7,40 - 9,90) mg/dL.
4. Terdapat perbedaan bermakna rerata kadar hemoglobin sebelum dan 30 menit setelah dilakukan aferesis trombosit dengan rerata penurunan 0,5 g/dL.
5. Terdapat perbedaan bermakna rerata jumlah trombosit sebelum dan 30 menit setelah dilakukan aferesis trombosit dengan rerata penurunan 80.000/mm³.
6. Terdapat perbedaan bermakna rerata kadar kalsium sebelum dan 30 menit setelah dilakukan aferesis trombosit dengan rerata penurunan 0,05 mg/dL.

7.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut dengan menambahkan perempuan sebagai subjek penelitian.