

## **BAB 7 PENUTUP**

### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan Skor Tovbin dengan luaran PAS di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode Januari-Desember 2023 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasien PAS lebih banyak berusia di bawah 35 tahun, memiliki riwayat SC di atas 1, dan semua pasien PAS memiliki status multigravida.
2. Pasien PAS lebih banyak mengalami perdarahan <1000ml, tidak menjalani perawatan ICU, tidak terdapat kematian ibu pada pasien PAS, dan lebih banyak menjalani tindakan histerektomi. Bayi dari pasien PAS lebih banyak menjalani perawatan NICU dan terdapat 1 kematian bayi pada pasien PAS.
3. Skor Tovbin lebih akurat dan sensitif dibanding skor PAI.
4. Terdapat hubungan signifikan antara Skor Tovbin dengan luaran perdarahan, histerektomi dan perawatan NICU pada pasien PAS.
5. Tidak terdapat hubungan signifikan antara Skor Tovbin dengan luaran perawatan ICU, kematian ibu, dan kematian bayi pada pasien PAS.

### **7.2 Saran**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan penggunaan Skor Tovbin sebagai alternatif dari Skor PAI dalam diagnosis PAS di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisa perbandingan sistem skoring untuk diagnosis kejadian PAS. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian terkait sistem skoring PAS sehingga didapatkan sebuah sistem yang optimal dalam mendiagnosis kejadian PAS.