BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai "Hubungan Derajat Nyeri Luka Perineum dengan Penyembuhan Menggunakan PRP pada Ibu Bersalin Normal di Puskesmas Kota Padang" dapat disimpulkan bahwa:

- Karakteristik subjek penelitian terbanyak berada pada usia ideal (20-35 tahun). Pekerjaan didominasi oleh ibu rumah tangga, pendidikan pada kelompok pasien yang diberi PRP didominasi oleh SMA, sementara pada kelompok kontrol ialah pendidikan SMA dan SMP. IMT didominasi oleh IMT normal, derajat luka didominasi oleh luka perineum derajat 2, dan derajat nyeri oleh derajat nyeri ringan. Sementara untuk paritas, pada kelompok yang diberi PRP didominasi oleh ibu nulipara sedangkan kelompok kontrol didominasi oleh ibu multipara.
- 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara derajat nyeri luka perineum dengan penyembuhan menggunakan PRP pada ibu bersalin normal di Puskesmas Kota Padang.

7.2 Saran

Diharapkan kedepannya PRP dapat digunakan untuk penyembuhan nyeri luka perineum pada persalinan normal.