

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai “Hubungan Tingkat Keberhasilan Penyembuhan Luka Ruptur Perineum Menggunakan PRP dan Tanpa PRP pada Ibu Bersalin Normal di Puskesmas Kota Padang” maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Karakteristik subjek penelitian paling banyak berada pada usia ideal. Pendidikan pada kelompok pasien yang diberi PRP didominasi oleh SMA, sedangkan pada kelompok kontrol didominasi pendidikan SMA dan SMP. Pekerjaan subjek penelitian didominasi oleh ibu rumah tangga. IMT terbanyak ialah IMT normal. Paritas pada kelompok yang diberi PRP didominasi oleh ibu nullipara sedangkan pada kelompok control didominasi oleh ibu multipara. Dan derajat luka didominasi oleh luka perineum derajat dua.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keberhasilan penyembuhan luka ruptur perineum dengan penggunaan PRP pada luka ruptur perineum ibu bersalin normal di puskesmas Kota Padang.

7.2 Saran

Untuk selanjutnya, diharapkan PRP bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penyembuhan luka ruptur perineum setelah persalinan normal.