

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Mayoritas pasien kanker ovarium tipe epitel stadium lanjut di RSUP Dr. M. Djamil Padang berusia di atas 50 tahun dengan usia menarcho ≥ 12 tahun dan jumlah paritas ≤ 2 . Stadium pada kanker ovarium umumnya terdiagnosis pada stadium III
2. Tipe histologi yang paling umum ditemukan adalah tipe *serous carcinoma*
3. Sebagian besar pasien kanker ovarium tipe epitel stadium lanjut mengalami metastasis ke *upper abdominal*
4. Tidak terdapat hubungan antara tipe histologi dengan pola metastasis kanker ovarium tipe epitel stadium lanjut

7.2 Saran

1. Bagi wanita usia >50 tahun dapat melakukan pencegahan dengan rutin melakukan *general check up* agar dapat terdeteksi lebih awal
2. Bagi para praktisi dan rumah sakit, penting untuk mempertimbangkan pemeriksaan metastasis ke *upper abdominal* pada pasien dengan kanker ovarium tipe *serous carcinoma*, serta mempersiapkan prosedur operasi secara optimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor lain seperti derajat diferensiasi kanker ovarium, serta memperluas rentang waktu pengumpulan data untuk mengidentifikasi perubahan pola metastasis dan hubungan histologi dari waktu ke waktu.