

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pasien Limfoma Non Hodgkin yang menjalani kemoterapi periode 2020 hingga 2022 di RS M. Djamil Padang, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penderita Limfoma Non Hodgkin terbanyak terdapat pada kelompok usia diatas 45-65 tahun, lebih banyak diderita oleh laki-laki dibanding perempuan, pekerjaan terbanyak tidak bekerja, stadium terbanyak adalah stadium III, mayoritas pasien tidak memiliki komorbid.
2. Efek samping terbanyak yang dialami oleh pasien Limfoma Non Hodgkin setelah menjalani kemoterapi adalah anemia.
3. Kejadian leukopenia terbanyak terjadi setelah pasien menjalani kemoterapi siklus ketiga.

6.2 Saran

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh perbedaan hormon pada laki-laki dan perempuan terhadap kejadian Limfoma Non Hodgkin.
2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang hubungan tingginya angka kejadian Limfoma Non Hodgkin pada pasien yang tidak bekerja dan pengaruh aktifitas sehari-hari dengan kejadian Limfoma Non Hodgkin.
3. Masyarakat terutama pasien yang terdiagnosis menderita Limfoma Non Hodgkin diharapkan mematuhi dan menjalani setiap protokol terapi Limfoma Non Hodgkin yang telah ditetapkan hingga tuntas.
4. Tenaga kesehatan diharapkan melakukan pencatatan yang lengkap dan jelas mengenai detail dari keadaan pasien, termasuk hasil laboratorium, keluhan pasien selama rawatan, dan sebagainya.