

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik fungsi seksual pada pasien satu tahun pasca ruptur perineum derajat II pada persalinan pervaginam yang tidak menggunakan selaput amnion segar menunjukkan skor FSFI (*female sexual function index*) yang lebih rendah pada seluruh domain.
2. Karakteristik fungsi seksual pada pasien satu tahun pasca ruptur perineum derajat II pada persalinan pervaginam yang menggunakan selaput amnion segar menunjukkan skor FSFI (*female sexual function index*) yang lebih tinggi pada seluruh domain.
3. Terdapat perbedaan signifikan dalam fungsi seksual antara pasien yang menggunakan dan tidak menggunakan selaput amnion segar.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disarankan:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, selaput amnion dapat dipertimbangkan sebagai alternatif terapi yang efektif dalam penyembuhan luka perineum dan perbaikan kualitas kehidupan seksual, khususnya pada wanita pasca persalinan.
2. Edukasi kepada pasien perlu diberikan mengenai manfaat penggunaan selaput amnion dalam penyembuhan luka perineum, dengan penekanan pada potensi peningkatan kualitas pemulihan dan dampaknya terhadap fungsi seksual.
3. Edukasi seksual yang komprehensif bagi masyarakat untuk menghilangkan stigma atau persepsi tabu terkait disfungsi seksual atau perawatan pasca persalinan.