

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan karakteristik sosiodemografi, mayoritas pasien DM tipe 2 merupakan perempuan, lansia, berpendidikan rendah, dan tidak bekerja, dengan sebagian besar memiliki penyakit penyerta, menerima pengobatan tunggal atau kombinasi, serta terbagi hampir merata dalam menilai kebergunaan *pillbox* sebagai berguna atau tidak berguna.
2. Tidak terdapat hubungan antara kebergunaan *pillbox* dengan kepatuhan pasien DM tipe 2 di Puskesmas Lubuk Kilangan Kota Padang.
3. Terdapat hubungan negatif yang signifikan dengan kekuatan korelasi yang sedang antara kepatuhan dengan gula darah sewaktu (GDS) pasien DM tipe 2 di Puskesmas Lubuk Kilangan Kota Padang.
4. Tidak terdapat hubungan antara kebergunaan *pillbox* dengan gula darah sewaktu (GDS) pasien DM tipe 2 di Puskesmas Lubuk Kilangan Kota Padang.

5.2 Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian lebih representatif.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, termasuk *confounding* faktor yang berpotensi memengaruhi hasil penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
3. Tenaga kesehatan disarankan untuk memberikan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan terkait pentingnya kepatuhan konsumsi obat.