

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang “Hubungan Infeksi *Ascaris lumbricoides* dengan Derajat Keparahan *Stunting* Anak Balita di Kanagarian Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat” didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Balita *stunting* di Nagari Koto Tinggi pada penelitian ini sebagian besar berada pada kelompok usia 24-35 bulan dan 48-59 bulan, dengan distribusi jenis kelamin yang merata antara laki-laki dan perempuan.
2. Balita *stunting* di Nagari Koto Tinggi pada penelitian didominasi oleh balita dengan kategori sangat pendek yaitu sebanyak 84,8%.
3. Kejadian infeksi *Ascaris lumbricoides* pada balita *stunting* di Nagari Koto Tinggi pada penelitian ini adalah sebesar 15,2%.
4. Tidak terdapat hubungan antara infeksi cacing *Ascaris lumbricoides* dengan derajat keparahan *stunting* pada balita di Nagari Koto Tinggi.

7.2 Saran

1. Penelitian ini belum mengkaji lebih lanjut berbagai faktor risiko lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menambahkan kuisioner yang mencakup faktor-faktor lain penyebab *stunting* pada balita seperti pola asuh, kualitas dan kuantitas asupan gizi, dan faktor sosio-ekonomi keluarga.
2. Pemeriksaan feses pada penelitian ini tidak dilakukan dalam satu waktu sehingga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan penelitian selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan feses dalam satu waktu.