BAB 6
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan mengenai Profil Koinfeksi TB Paru pada Pasien HIV/AIDS di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah:

1. Usia pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah kelompok usia 26-35 tahun.
2. Jenis kelamin pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah laki-laki.
3. Gejala klinis pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah batuk kering.
4. Lokasi TB pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah TB paru.
5. Jumlah CD4 pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah <200 sel/mm^3.
6. Gambaran radiografi toraks pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah infiltrat dengan letak terbanyak di apex paru dan jumlah kelainan terbanyak pada pasien adalah 1 gambaran.
7. Jenis penyakit penyerta pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah *Candidiasis oral* dan jumlah penyakit penyerta terbanyak pada pasien adalah 1 penyakit penyerta.
8. Jenis TB yang terdiagnosis TCM pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah TB sensitif obat.
9. Pilihan terapi HIV pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah kombinasi TDF + 3TC + DTG
10. Pilihan terapi TB pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah kombinasi OAT KDT.
11. Komplikasi pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah DILI.
12. Luaran pasien HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru terbanyak adalah hidup.

6.2 Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan pasien dengan berbagai tingkat progresivitas penyakit, tidak hanya pasien rujukan, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan populasi umum penderita HIV/AIDS dengan koinfeksi TB paru.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA