

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Tidak terdapat pengaruh secara bermakna ( $p > 0,05$ ) terapi obat gagal jantung dengan kadar elektrolit natrium saat admisi dengan satu minggu dan satu bulan. Namun terdapat pengaruh secara bermakna ( $p < 0,05$ ) tekanan darah (sistolik dan diastolik) dan denyut nadi saat admisi dengan satu minggu dan satu bulan pada pasien gagal jantung yang mengalami hiponatremia dan natrium normal saat admisi yang di rawat RSUP Dr. M. Djamil Padang.
2. Tidak terdapat pengaruh secara bermakna ( $p > 0,05$ ) terapi obat gagal jantung dengan kadar kalium darah saat admisi dengan satu minggu dan satu bulan. Namun terdapat pengaruh secara bermakna ( $p < 0,05$ ) tekanan darah (sistolik dan diastolik) dan denyut nadi saat admisi dengan satu minggu dan satu bulan pada pasien gagal jantung yang mengalami hipokalemia, kalium normal dan hiperkalemia saat admisi yang di rawat RSUP Dr. M. Djamil Padang.

### 5.2. Saran

Hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keterbatasan, dimana faktor jenis terapi dan komorbiditas memiliki kategori cukup banyak dan bervariasi, sebaiknya diikuti dengan jumlah pasien yang berimbang untuk masing-masing kategori