


SKRIPSI

HUBUNGAN ANTARA KESEHATAN MENTAL IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI KOTA PADANG

Penelitian Keperawatan Maternitas



FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

APRIL 2025

SKRIPSI

**HUBUNGAN ANTARA KESEHATAN MENTAL IBU HAMIL DENGAN
KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI KOTA PADANG**

Penelitian Keperawatan Maternitas



**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
APRIL 2025**

SKRIPSI

**HUBUNGAN ANTARA KESEHATAN MENTAL IBU HAMIL DENGAN
KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI KOTA PADANG**

Penelitian Keperawatan Maternitas



FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

APRIL 2025

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

APRIL 2025

Nama : Salsabila

Nim : 2111312036

**Hubungan Antara Kesehatan Mental Ibu Hamil Dengan Kejadian
Preeklamsia di Kota Padang**

ABSTRAK

Hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia/eklamsia) merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu. Salah satu faktor penyebab preeklamsia adalah terganggunya kesehatan mental ibu saat kehamilan seperti depresi, kecemasan dan stress. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara kesehatan mental ibu hamil dengan kejadian preeklamsia. Jenis penelitian ini yaitu analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional*. populasi dalam penelitian ini sebanyak 529 ibu hamil dan didapatkan sampel sebanyak 228 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hubungan antar variabel dianalisis dengan uji *chi square* dengan kemaknaan $p < 0,05$. Penilaian preeklamsia diperoleh dari data sekunder rekam medis pasien. Tingkat stres dinilai dengan kuesioner DASS-21. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 55,3% ibu hamil mengalami kesehatan mental yang terganggu dan sebanyak 17,5% ibu mengalami preeklamsia. Terdapat hubungan yang bermakna antara kesehatan mental ibu hamil dengan kejadian preeklamsia dengan $p \text{ value} = < 0,0001$ ($p < 0,05$). Diharapkan kepada tenaga kesehatan seperti perawat, bidan atau psikolog untuk dapat memaksimalkan skrining minimal sekali dalam masa perawatan antenatal dengan menggunakan instrument penilaian psikologis terstandar sebagai bagian dari perawatan antenatal standar untuk deteksi dini gangguan kesehatan mental dan pencegahan preeklamsia.

Kata kunci: ibu hamil, kesehatan mental, preeklamsia

Daftar pustaka: 63 (2012-2024)

NURSING FACULTY
ANDALAS UNIVERSITY
APRIL 2025

Name : Salsabila
Student ID Number : 2111312036

***The Relationship Between Mental Health of Pregnant Women and the
Incidence of Preeclampsia in Padang City***

ABSTRACT

Hypertension in pregnancy (preeclampsia/eclampsia) is one of the most important major cause of maternal morbidity and mortality. One of the contributing factors preeclampsia is the disruption of maternal mental health during pregnancy such as depression, anxiety and stress. The purpose of this study was to determine the relationship between mental health of pregnant women and the incidence of preeclampsia. Type of research This type of research is observational analytic with a cross sectional approach. population population in this study were 529 pregnant women and a sample of 228 people was obtained by using purposive sampling technique. people using purposive sampling technique. Data analysis The data analysis used in this study used univariate and bivariate analysis. The relationship between variables was analyzed with the chi square test with a significance of $p < 0.05$. Preeclampsia assessment Preeclampsia assessment was obtained from secondary data of the patient's medical record. Stress level was assessed with DASS-21 questionnaire. The results showed that as many as 55.3% of pregnant women experienced mental health and as many as 17.5% of mothers experienced preeclampsia. There is a significant relationship between There is a significant relationship between mental health of pregnant women with the incidence of preeclampsia with a p value = < 0.0001 ($p < 0.05$). It is expected that health workers such as nurses, midwives or psychologists to be able to maximize screening at least once during the antenatal care period. at least once in the antenatal care period by using a standardized assessment instrument as part of standardized antenatal care for early detection of mental health disorders and for early detection of mental health disorders and prevention of preeclampsia.

Keywords: pregnant women, mental health, preeclampsia

Bibliography: 63 (2012-2024)