

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Usia ≥ 45 tahun merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian rekurensi pada pasien kanker kulit Karsinoma sel Skuamosa yang dilakukan tindakan wide eksisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
2. Gejala Neurologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian rekurensi pada pasien kanker kulit Karsinoma sel Skuamosa yang dilakukan tindakan wide eksisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
3. Lokasi Predileksi *High Risk* merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian rekurensi pada pasien kanker kulit Karsinoma sel Skuamosa yang dilakukan tindakan wide eksisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
4. Stadium merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian rekurensi pada pasien kanker kulit Karsinoma sel Skuamosa yang dilakukan tindakan wide eksisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
5. Riwayat kanker sebelumnya merupakan faktor yang tidak berhubungan dengan kejadian rekurensi pada pasien kanker kulit Karsinoma sel Skuamosa yang dilakukan tindakan wide eksisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
6. Riwayat Radioterapi merupakan faktor yang tidak berhubungan dengan kejadian rekurensi pada pasien kanker kulit Karsinoma sel Skuamosa yang dilakukan tindakan wide eksisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
7. Stadium merupakan faktor yang paling dominan dalam kejadian rekurensi pada pasien kanker kulit Karsinoma sel Skuamosa yang dilakukan tindakan wide eksisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

7.2 Saran

1. Penelitian di masa yang akan datang diharapkan dapat menggunakan rentang waktu yang lebih panjang dan menilai jenis kanker kulit lainnya yang dilakukan tindakan wide eksisi di bagian bedah onkologi RSUP Dr. M. Djamil Padang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data referensi prevalensi dan hubungan kanker kulit Karsinoma sel Skuamosa yang dilakukan tindakan wide eksisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

