

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Median kadar BAFF serum pada pasien LES adalah 0,51 (0,16 – 3,15) ng/ml dan median kadar APRIL serum pada pasien LES adalah 0,31 (0,14 – 1,78) ng/mL.
2. Median kadar BAFF serum pada LES aktivitas ringan adalah 0,36 (0,16 – 0,45) ng/mL, LES aktivitas sedang adalah 0,51 (0,40 – 0,58) ng/mL, LES aktivitas berat adalah 1,11 (0,55 – 3,15) ng/mL.
3. Median kadar APRIL serum pada LES aktivitas ringan adalah 0,25 (0,14 – 0,32) ng/mL, LES aktivitas sedang adalah 0,30 (0,21 – 0,40) ng/mL, LES aktivitas berat adalah 0,76 (0,34 – 1,78) ng/mL.
4. Terdapat perbedaan kadar BAFF serum yang bermakna secara statistik pada pasien LES derajat aktivitas ringan, sedang, dan berat.
5. Terdapat perbedaan kadar APRIL serum yang bermakna secara statistik pada pasien LES derajat aktivitas ringan, sedang, dan berat.

7.2 Saran

1. Perlu pertimbangan pemeriksaan BAFF dan APRIL sebagai biomarker prognosis dan tatalaksana penyakit LES.
2. Disarankan penelitian selanjutnya melibatkan berbagai faktor lain yang memengaruhi kadar BAFF dan APRIL seperti sel T, komplemen C3 dan C4, hormon estrogen, dan pengaruh obat yang sedang dikonsumsi.
3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan nilai normal kadar BAFF dan APRIL dalam menilai derajat aktivitas penyakit LES.