

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan 37 rekam medis pasien KA-HIV di RSUP Dr. M. Djamil Padang, diperoleh kesimpulan berikut:

1. Distribusi frekuensi karakteristik pasien KA-HIV didapatkan bahwa mayoritas usia adalah 17-25 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, dan tingkat pendidikan paling banyak adalah tingkat pendidikan menengah. Status pekerjaan umumnya tidak bekerja dan status pernikahan paling umum adalah belum menikah . Memiliki lebih dari satu pasangan seksual yang tidak menggunakan kondom saat melakukan aktivitas seksual serta orientasi seksual umumnya heteroseksual.
2. Distribusi frekuensi gambaran klinis pasien KA-HIV terbanyak adalah gatal dengan lama penyakit kurang atau sama dari 3 bulan. Bentuk morfologi lesi paling banyak adalah akuminata dengan lokasi tersering adalah perianal dan yang hanya terbatas pada satu lokasi saja.
3. Distribusi frekuensi riwayat penggunaan ARV pada pasien KA-HIV yang paling banyak adalah pasien yang telah mendapatkan terapa ARV dengan modalitas terapu menggunakan 80-90% TCA.

#### **6.2 Saran**

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi perkembangan kondiloma akuminata (KA) pada pasien HIV. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat kepatuhan terhadap terapi antiretroviral (ARV), serta adanya infeksi menular seksual (IMS) lain yang menyertai. Dengan mengkaji faktor-faktor tersebut.