BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Sebagian besar pasien berusia >44 tahun dan memiliki jenis kelamin perempuan.
2. Terdapat penurunan signifikan dari kadar CRP sebelum dan sesudah pemberian OAT pada pasien TB paru.
3. Terdapat penurunan signifikan dari kadar CRP sebelum dan sesudah pemberian OAT pada pasien *Spondylitis* TB.
4. Terdapat penurunan signifikan nilai LED sebelum dan sesudah pemberian OAT pada pasien TB paru.
5. Terdapat penurunan signifikan dari nilai LED sebelum dan sesudah pemberian OAT pada pasien *spondylitis* TB.
6. Tidak terdapat perbedaan efektivitas pemberian OAT selama 2 bulan yang dinilai berdasarkan kadar CRP antara pasien TB paru dan *spondylitis* TB.
7. Tidak terdapat perbedaan efektivitas pemberian OAT selama 2 bulan yang dinilai berdasarkan nilai LED antara pasien TB paru dan *spondylitis* TB.

7.2 Saran

1. Penelitian ini dapat dijadikan dasar pedoman evaluasi terapi OAT menggunakan CRP dan LED yang murah dan kurang invasive pada pasien *spondylitis* TB.

2. Penelitian selanjutnya yang menilai efektivitas OAT setelah 6 bulan pengobatan menggunakan LED dan CRP pada *spondylitis* TB diperlukan untuk melihat peranan kedua marker ini dalam evaluasi terapi jangka panjang.
3. Penelitian yang menghubungkan outcome klinis pasien *spondylitis* TB dengan marker LED dan CRP setelah diberikan OAT perlu dilakukan untuk melihat keselarasannya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA