

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Gambaran Komplikasi Pasca Odontektomi Molar Ketiga Menggunakan Anestesi Umum di Rumah Sakit Universitas Andalas”, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Gambaran komplikasi pasien pada hari ketujuh pasca odontektomi molar ketiga menggunakan anestesi umum di Rumah Sakit Universitas Andalas periode 6 Februari 2025–27 Maret 2025 mengalami komplikasi nyeri ringan, pembengkakan ringan, trismus ringan, dan tidak mengalami parestesia.
2. Tingkat komplikasi nyeri yang paling banyak dialami oleh pasien adalah nyeri ringan sebanyak 15 orang (46,9%), dilanjutkan dengan pasien tidak mengalami nyeri sebanyak 13 orang (40,6%), nyeri sedang sebanyak 2 orang (6,3%), dan nyeri berat sebanyak 2 orang (6,3%) pada hari ketujuh pasca operasi odontektomi molar ketiga menggunakan anestesi umum di Rumah Sakit Universitas Andalas periode 6 Februari 2025–27 Maret 2025.
3. Tingkat komplikasi pembengkakan yang paling banyak dialami oleh pasien adalah pembengkakan ringan sebanyak 27 orang (84,4%), dilanjutkan dengan tidak ada pembengkakan sebanyak 5 orang (15,6%), dan tidak ada pasien yang mengalami pembengkakan sedang dan parah pada hari ketujuh pasca operasi odontektomi molar ketiga menggunakan anestesi umum di Rumah Sakit Universitas Andalas periode 6 Februari 2025–27 Maret 2025.

4. Tingkat komplikasi trismus yang paling banyak dialami oleh pasien adalah trismus ringan sebanyak 14 orang (43,8%), dilanjutkan dengan tidak mengalami trismus 13 orang (40,6%), trismus sedang sebanyak 5 orang (15,6%), dan tidak ada pasien yang mengalami trismus parah pada hari ketujuh pasca operasi odontektomi molar ketiga menggunakan anestesi umum di Rumah Sakit Universitas Andalas periode 6 Februari 2025–27 Maret 2025.
5. Komplikasi parestesia hanya terjadi pada 6 orang (18,8%) dan sebanyak 26 orang (81,3%) tidak mengalami parestesia pada hari ketujuh pasca operasi odontektomi molar ketiga menggunakan anestesi umum di Rumah Sakit Universitas Andalas periode 6 Februari 2025–27 Maret 2025.

5.2 Saran

- Penambahan kontrol waktu pengamatan komplikasi pasca odontektomi yang lebih dari satu kali yaitu pada hari kelima pasca odontektomi molar ketiga.
- Pelaksanaan analisis komplikasi yang terpisah berdasarkan teknik flap operator dalam melakukan odontektomi.
- Penggunaan kriteria inklusi-eksklusi yang lebih selektif untuk mengeliminasi bias akibat faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan dari pasien setelah melakukan odontektomi.
- Penambahan variabel yang dapat mendukung penilaian komplikasi nyeri seperti pH saliva sebagai pemeriksaan objektif.
- Hubungan atau pengaruh timbal balik antar jenis komplikasi pasca odontektomi.
- Pelaksanaan analisis komplikasi pasca odontektomi molar ketiga menggunakan anestesi lokal.

- g. Pasien tidak perlu merasakan kekhawatiran yang berlebihan karena komplikasi pasca odontektomi hari ketujuh umumnya bersifat ringan dan dapat ditoleransi dengan baik.

