

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Istilah konkordansi masih asing bagi tenaga kesehatan dan pasien, tetapi pelaksanaan aspek-aspek konkordansi sebagian sudah dilaksanakan.
2. Faktor konkordansi yang mempengaruhi resiliensi pasien yaitu knowledge, partnership, support dan share decision making. Namun faktor yang paling berpengaruh terhadap resiliensi pasien yaitu support. Tidak adanya respon atau lambatnya respon dari tenaga kesehatan atau dokter selama pengobatan menyebabkan rendahnya resiliensi pasien TB.
3. Konstruksi dari Model RONI terdiri dari support, share decision making, knowledge dan partnership. Support memiliki pengaruh sebanyak 4,7 x untuk meningkatkan resiliensi pasien TB.
4. Keberhasilan model ini tidak terlepas dari aplikasi model sebagai alat bantu peneliti untuk meningkatkan support agar tercapainya resiliensi. Aplikasi ini berperan penting dan layak bagi tenaga kesehatan untuk memberikan support yang tepat bagi pasien TB. Aplikasi juga dapat diakses pasien TB untuk melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan.
5. Hasil pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan resiliensi peserta setelah implementasi model RONI. Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,001$ maka implementasi Model RONI efektif meningkatkan resiliensi pasien TB.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terutama terkait dengan masih rendahnya resiliensi pasien TB di Kota Padang, dengan ini disampaikan beberapa rekomendasi penting:

1. Sosialisasi tentang konsep konkordansi bagi tenaga Kesehatan di Kota Padang dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang direkomendasikan untuk membuat kebijakan dan pengembangan aplikasi RONI dalam meningkatkan program pengobatan TB.
2. Model ini direkomendasikan untuk BPJS kesehatan di Kota Padang sebagai solusi untuk peningkatan utilisasi FKTP khususnya dalam pelayanan TB .
3. Perlu adanya komitmen ulang dari tenaga kesehatan untuk melakukan support yang baik dalam pelayanan TB di FKTP Kota Padang.
4. Tenaga kesehatan dan pemegang program TB Puskesmas dapat mendorong pasien untuk menggunakan aplikasi RONI dan melakukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi RONI.

