

## **BAB 7 PENUTUP**

### **7.1 Kesimpulan**

1. Penderita skizofrenia yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki karakteristik yang didominasi oleh jenis kelamin pria, median usia responden 33 tahun, tingkat pendidikan menengah atas, berstatuskan bekerja dan tidak kawin serta dengan median lama pengobatan 8 tahun.
2. Derajat merokok pada penderita skizofrenia yang menjadi responden didominasi oleh derajat merokok sedang dan ringan, serta yang paling jarang ditemukan adalah derajat merokok berat.
3. Hasil tes fungsi kognitif penderita skizofrenia yang menjadi responden sebagian besar menunjukkan hasil yang tidak normal dibandingkan yang normal.
4. Berdasarkan hasil uji analisis antara derajat merokok dengan fungsi kognitif penderita skizofrenia yang menjadi responden pada penelitian ini didapatkan hasil yang tidak berhubungan, sehingga dengan derajat merokok yang berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap fungsi kognitif ataupun sebaliknya.

### **7.2 Saran**

1. Bagi institusi kesehatan terkait penelitian
  - a. Sebaiknya pada saat mengidentifikasi dan anamnesis pasien dengan diagnosis skizofrenia juga ditanyakan bagaimana riwayat merokok selama hidupnya.
  - b. Lebih menggali lebih dalam terkait identitas pasien yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat Pendidikan, status pekerjaan, status perkawinan dan lama pengobatan karena semua hal tersebut dapat memiliki pengaruh terhadap riwayat kondisi pasien.
  - c. Diadakannya tes fungsi kognitif secara berkala kepada pasien untuk mengetahui bagaimana perkembangan kognitif dari pasien skizofrenia.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini dari segi kehomogenitasan subjek penelitian agar faktor penyebab bias tidak terlalu mempengaruhi hasil penelitian.
- b. Dapat melakukan penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif lainnya selain dari kebiasaan merokok pada pasien.

