

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar pasien yang mengonsumsi antipsikotik selama jangka waktu lebih dari enam bulan mengalami penurunan hitung jumlah leukosit.
2. Tidak terdapat perbedaan bermakna perubahan hitung jenis leukosit pada pasien yang mengonsumsi antipsikotik baik pemberian jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Terdapat hubungan bermakna antara lama terapi antipsikotik jangka pendek dengan jangka panjang dalam hal hitung jumlah leukosit pasien skizofrenia di RSJ HB Saanin Padang
4. Tidak terdapat hubungan bermakna antara lama terapi antipsikotik jangka pendek dengan jangka panjang dalam hal hitung jenis leukosit pasien skizofrenia di RSJ HB Saanin Padang

7.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai secara spesifik antipsikotik tertentu yang dapat menyebabkan penurunan hitung jumlah dan hitung jenis leukosit pada pasien skizofrenia
2. Perlu dilakukan penelitian lebih spesifik mengenai masing-masing kategori hitung jenis leukosit pasien sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap hitung jumlah relative dan absolut dari jumlah hitung jenis.
3. Perlu dilakukan penelitian mengenai obat spesifik tertentu yang dapat memengaruhi hitung jumlah dan hitung jenis leukosit pasien.

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai dosis obat secara spesifik antipsikotik tertentu yang dapat menyebabkan penurunan hitung jumlah dan hitung jenis leukosit pada pasien skizofrenia
5. Bagi institusi kesehatan terkait agar dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam upaya pengendalian efek samping yang mungkin terjadi pada penanganan pengobatan antipsikotik pasien skizofrenia terutama yang berkaitan dengan monitoring jumlah dan hitung jenis leukosit pasien, misalnya dengan melakukan monitoring sebanyak sekali dalam 6 bulan pemakaian.

