BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan yang bermakna antara perdarahan mukosa, nyeri perut, muntah yang menetap dan hepatomegali pada penderita DBD dengan syok dan tanpa syok
2. Terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar hematokrit dan penurunan kadar trombosit pada penderita DBD dengan syok dan tanpa syok namun tidak terdapat perbedaan nilai SGOT dan SGPT pada kedua kelompok tersebut
3. Terdapat perbedaan rerata kadar Ang-2 antara penderita DBD dengan syok dibandingkan dengan tanpa syok, namun tidak terdapat perbedaan rerata kadar *sVE-Cadherin* pada penderita DBD dengan syok dan tanpa syok
4. Terdapat perbedaan faktor prediktor (gejala klinis, laboratorium, molekuler) pada penderita DBD dengan syok dan tanpa syok
5. Nilai *cut off point* dalam memprediksi terjadinya syok pada penderita DBD berada diantara *cut off point* 15,5 (digenapkan 16), maka penentuan klasifikasi :

   a. Pada DBD dengan skor ≥ 16 diprediksi akan mengalami DSS.

   b. Pada DBD dengan skor < 16 diprediksi tidak akan mengalami DSS.

7.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan verifikasi terhadap model prediksi dengan jumlah subjek yang lebih besar.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan serotipe virus dengue, NS1 dan *viral load* yang mungkin ikut mempengaruhi tingkat keparahan penyakit akibat infeksi virus dengue pada anak.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA