

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Terdapat perubahan patensi pungtum lakrimal pada pemakaian latanoprost 0,005% non preservatif mono terapi dalam jangka waktu 3 bulan sebesar 15% . Perubahan ini tidak bermaksa secara statistik
2. Terdapat perubahan patensi kanalis lakrimalis pada pemakaian latanoprost 0,005% non preservatif mono terapi dalam jangka waktu 3 bulan sebesar 5%. Perubahan ini tidak bermaksa secara statistik.
3. Daerah obstruksi terbanyak ditemukan pada penelitian ini adalah pada pungtum lakrimal.

7.2. Saran

1. Diperlukan waktu penelitian atau durasi pakai latanoprost yang lebih lama untuk mengetahui kapan munculnya efek samping latanoprost terhadap saluran lakrimal.
2. Diperlukan penelitian pembanding mengetahui perubahan patensi saluran lakrimal pada pemakaian latanoprost topikal pada populasi yang lebih muda atau pada obat topikal glaukoma lainnya
3. Perlu dipertimbangkan melakukan pemeriksaan patensi saluran lakrimal atas setelah pemakaian lebih dari 3 bulan pada pengguna latanoprost topikal 0,005% non preservatif monoterapi.