

BAB 7

PENUTUP

7.1 Simpulan

7.1.1 Sensitivitas pemeriksaan rapid antigen

lipoarabinomannan urine untuk mendiagnosis TB paru aktif pada pasien HIV sebesar 94,73%

7.1.2 Spesifisitas pemeriksaan rapid antigen

lipoarabinomannan urine untuk mendiagnosis TB paru aktif pada pasien HIV sebesar 90,00%

7.1.3 Nilai duga positif pemeriksaan rapid antigen

lipoarabinomannan urine untuk mendiagnosis TB paru aktif pada pasien HIV sebesar 90,00%

7.1.4 Nilai duga negatif pemeriksaan rapid antigen

lipoarabinomannan urine untuk mendiagnosis TB paru aktif pada pasien HIV sebesar 94,73%

7.1.5 Akurasi diagnosis pemeriksaan rapid antigen

lipoarabinomannan urine untuk mendiagnosis TB paru aktif pada pasien HIV sebesar 92,30%

7.2 Saran

7.2.1 Pemeriksaan *rapid antigen lipoarabinomannan* urine dapat digunakan sebagai modalitas pemeriksaan lain dalam

menegakkan diagnosis TB pada pasien HIV yang tidak dapat menghasilkan sputum.

- 7.2.2 Pemeriksaan *rapid antigen lipoarabinomannan* urine dapat digunakan sebagai pemeriksaan awal pada pasien HIV yang dicurigai TB dengan kondisi klinis yang berat dan tidak tersedia pemeriksaan CD4+.

