

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai rerata ketebalan RNFL didapatkan paling tebal pada stadium POAG ringan dan paling tipis pada stadium POAG berat.
2. Nilai rerata ketebalan GCIPL didapatkan paling tebal pada stadium POAG ringan dan paling tipis pada stadium POAG berat.
3. Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dimana semakin berat stadium POAG, semakin tipis ketebalan RNFL.
4. Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dimana semakin berat stadium POAG, semakin tipis ketebalan GCIPL.
5. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara stadium POAG dengan stadium VFI.

7.2 Saran

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian desain longitudinal untuk memantau perubahan ketebalan RNFL dan GCIPL dari waktu ke waktu dan kaitannya dengan perubahan lapang pandang.
2. Diperlukan data dengan jumlah sampel yang lebih besar serta data VFI yang lebih lengkap agar analisis stadium POAG dan stadium VFI lebih valid
3. Diperlukan kontrol terhadap faktor-faktor lain seperti status refraksi, tekanan intraokular komorbid mata lain yang dapat memengaruhi ketebalan retina.