

KARYA ILMIAH AKHIR

**ASUHAN KEPERAWATAN DAN PENERAPAN TERAPI OKUPASI:
MENGAMBAR PADA TN. T DENGAN HALUSIASI
PENDENGARAN DI RSJ PROF HB SAANIN
PADANG**

Peminatan Keperawatan Jiwa



FIKRATUL AFDILA, S. Kep

NIM. 2441312001

Pembimbing Utama

Dr. Ns. Dewi Eka Putri, M. Kep., Sp. Kep.

Pembimbing Pendamping

Ns. Ira Erwina, M.Kep., Sp.Kep.J

PROGRAM STUDI PROFESI NERS

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
JUNI 2025**

**Nama : Fikratul Afdila, S. Kep
NIM : 2441312001**

**Asuhan Keperawatan dan Penerapan Terapi Okupasi Menggambar pada
Tn. T dengan Halusinasi Pendengaran di RSJ Prof HB Saanin Padang**

ABSTRAK

Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditemukan pada pasien skizofrenia yang akan mengalami perubahan pada persepsi sensorinya. Halusinasi yang paling banyak diderita yaitu halusinasi pendengaran sebanyak 70%. Salah satu intervensi yang dapat diberikan adalah terapi menggambar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian terapi generalis dan terapi menggambar pada Tn. T dengan masalah halusinasi pendengaran. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, pendokumentasian, pelaksanaan pemberian terapi generalis selama 5 hari dan terapi menggambar selama 5 hari untuk mengontrol halusinasi pada klien dengan halusinasi pendengaran. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner AHRS (*Auditory Hallucination Rating Scale*) untuk mengukur tingkat halusinasi klien saat *pre test* dan *post test*. Hasil evaluasi didapatkan penurunan skor pada *pre test* terapi generalis yaitu 25, skor *pre test* terapi menggambar yaitu 18 dan skor *post test* terapi menggambar yaitu 13. Hal ini menunjukkan bahwa terapi generalis dan terapi menggambar efektif dalam menurunkan tingkat halusinasi pendengaran. Diharapkan kepada pasien agar rutin menerapkan terapi generalis dan terapi menggambar untuk menurunkan tingkat halusinasi yang dialami pasien skizofrenia. Diharapkan kepada keluarga pasien untuk memberikan dukungan dan mendampingi pasien dalam melaksanakan terapi yang diberikan. Kepada perawat dianjurkan untuk menerapkan terapi generalis dan terapi menggambar kepada pasien dengan halusinasi.

Kata kunci : Halusinasi Pendengaran, Terapi Menggambar, Skizofrenia
Daftar Pustaka : 77 (2014-2025)

**FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
JUNE, 2025**

**Name : Fikratul Afdila, S. Kep
Student ID Number : 2441312001**

***Nursing Care and Application of Drawing Occupational Therapy for Mr. T with
Auditory Hallucinations at Prof. HB Saanin Psychiatric Hospital Padang***

ABSTRACT

Hallucinations are a common symptom of mental disorders found in schizophrenia patients, who experience changes in their sensory perception. Auditory hallucinations are the most prevalent type, affecting 70% of patients. One intervention that can be provided is drawing therapy. This study aimed to investigate the effect of generalist therapy and drawing therapy on Mr. T, who was experiencing auditory hallucinations. This research employed a case study method, utilizing interviews, observations, physical examinations, documentation, and the administration of generalist therapy for 5 days and drawing therapy for 5 days to control hallucinations in a client with auditory hallucinations. The Auditory Hallucination Rating Scale (AHRs) questionnaire was used as an instrument to measure the client's hallucination levels during pre-test and post-test. The evaluation results showed a decrease in scores: the pre-test score for generalist therapy was 25, the pre-test score for drawing therapy was 18, and the post-test score for drawing therapy was 13. This indicates that both generalist therapy and drawing therapy are effective in reducing the level of auditory hallucinations. It is hoped that patients will regularly implement both generalist therapy and drawing therapy to reduce the level of hallucinations they experience. Furthermore, it is expected that patients' families will provide support and accompany them in carrying out the prescribed therapy. Nurses are encouraged to apply generalist therapy and drawing therapy to patients experiencing hallucinations.

**Keywords : Auditory Hallucinations, Drawing Therapy, Schizophrenia
References : 77 (2014-2025)**