BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor risiko yang paling banyak dimiliki ibu dengan anak CL/P yang didapatkan dari RSUP Dr. M. Djamil dan Rumah Sakit Aisyiyah Kota Padang adalah riwayat trauma selama kehamilan selama trimester pertama. Sedangkan, faktor risiko yang paling banyak didapatkan dari Rumah Sakit Universitas Andalas adalah riwayat paparan asap rokok selama trimester pertama kehamilan.
2. Jenis CL/P yang paling banyak ditemukan di RSUP Dr. M. Djamil, Rumah Sakit Umum Aisyiyah, dan Rumah Sakit Universitas Andalas adalah CLP.
3. Jenis CL/P di sisi kiri lebih sering ditemukan dari pada di sisi kanan maupun bilateral. Berdasarkan lateralitas dan dasar embriologi, kasus yang paling banyak ditemukan adalah CLP komplit unilateral di sisi kiri dan ICP inkomplit unilateral di sisi kiri.

6.2 Saran

1. Diperlukan penelitian epidemiologi mengenai CL/P dengan melibatkan sampel dari seluruh rumah sakit di Sumatra Barat guna memperoleh gambaran CL/P yang lebih akurat dan menyeluruh.

2. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai analisis faktor risiko yang paling berperan pada kejadian CL/P dan tingkat pengetahuan ibu mengenai faktor risiko CL/P.

3. Diperlukan edukasi masyarakat oleh Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan mengenai faktor risiko CL/P, guna mencegah bayi lahir dengan CL/P, khususnya yang disebabkan oleh faktor risiko lingkungan.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK
BANGSA