**EKSPLORASI *BUFFER* DAN KONSENTRASI OPTIMAL VITAMIN C
SERTA *GLUTATHIONE* DALAM PENGECER UNTUK MENJAGA
KUALITAS SEMEN CAIR ENTOK (*Cairina Moschata*)**

TESIS

OLEH

Betri Wahyu Agustin

2420611002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

**EKSPLORASI *BUFFER* DAN KONSENTRASI OPTIMAL VITAMIN C
SERTA *GLUTATHIONE* DALAM PENGECER UNTUK MENJAGA
KUALITAS SEMEN CAIR ENTOK (*Cairina Moschata*)**

TESIS

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Ilmu Peternakan pada
Program Pascasarjana Fakultas Peternakan Universitas Andalas*

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

**EKSPLORASI *BUFFER* DAN KONSENTRASI OPTIMAL VITAMIN C
SERTA *GLUTATHIONE* DALAM PENGECER UNTUK MENJAGA
KUALITAS SEMEN CAIR ENTOK (*Cairina Moschata*)**

Betri Wahyu Agustin dibawah bimbingan

Dr. Ir. Tinda Afriani, M.P. dan Prof. Dr. Ir. Tertia Delia Nova, M. Si.

Program Studi Ilmu Peternakan Pascasarjana Universitas Andalas Padang

ABSTRAK

Peningkatan kualitas semen entok (*Cairina moschata*) sangat penting untuk mendukung keberhasilan inseminasi buatan (IB) serta perbaikan genetik unggas lokal. Namun, kualitas spermatozoa sering menurun akibat stres oksidatif selama penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengencer yang paling efektif serta konsentrasi antioksidan optimal dalam mempertahankan kualitas semen selama penyimpanan dingin. Pada tahap pertama, empat jenis pengencer (BPSE, Ringer's Lactate [RL], PBS, dan NaCl) diuji menggunakan rancangan split plot dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil menunjukkan bahwa RL merupakan buffer paling efektif karena mampu mempertahankan motilitas, viabilitas, dan longivitas spermatozoa lebih baik dibandingkan pengencer lainnya. Pada tahap kedua, RL digunakan untuk menguji pengaruh penambahan glutathione dan vitamin C dengan konsentrasi 0,1; 0,2; 0,3; dan 0,4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi antioksidan berpengaruh sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap kualitas semen. Konsentrasi terbaik diperoleh pada 0,1 mM glutathione dan 0,1 g vitamin C, yang mampu mempertahankan motilitas dan viabilitas tertinggi serta menekan abnormalitas dan kerusakan membran plasma setelah penyimpanan 72 jam. Kesimpulannya, Ringer's Lactate merupakan pengencer paling efektif untuk semen entok, dan penambahan 0,1 mM glutathione serta 0,1 g vitamin C memberikan perlindungan optimal untuk mendukung program IB pada unggas lokal.

Kata kunci: entok, pengencer semen, *Ringer's Lactate*, *glutathione*, vitamin C, inseminasi buatan