

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Karakteristik dasar menunjukkan subjek kelompok trombolisis memiliki rerata usia 59,28 tahun, didominasi oleh laki-laki, dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA dan S1. Sementara itu, subjek kelompok tanpa trombolisis memiliki rerata usia 60,48 tahun, didominasi oleh laki-laki, dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA.
2. Nilai NLR dan skor NIHSS tidak berbeda diantara dua kelompok. Sementara itu, terdapat perbedaan pada kadar TGF- β 1 kedua kelompok dengan dan tanpa trombolisis dimana pada kelompok trombolisis kadar TGF- β 1 lebih tinggi dibandingkan tanpa trombolisis.
3. Tidak terdapat hubungan NLR dengan tingkat keparahan stroke iskemik akut dengan dan tanpa trombolisis.
4. Terdapat hubungan TGF- β 1 dengan tingkat keparahan stroke iskemik akut dengan dan tanpa trombolisis.

7.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat dilakukan pada beberapa *centre* penelitian sekaligus sehingga didapatkan gambaran lebih luas terkait perbedaan NLR dan TGF- β 1 pada pasien dengan stroke iskemik akut dengan dan tanpa trombolisis.
2. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat melakukan penilaian nilai NLR dan kadar TGF- β 1 pada beberapa waktu sekaligus seperti saat admisi dan 72 jam onset sehingga dapat diketahui perubahan nilai NLR dan TGF- β 1 setelah onset stroke.