

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Prevalensi PPOK eksaserbasi akut tipe eosinofilik pada penelitian ini adalah 15,1% dan sisanya merupakan tipe non-eosinofilik.
2. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik dasar pasien PPOK eksaserbasi akut antara tipe eosinofilik dan non-eosinofilik, kecuali pada derajat eksaserbasi PPOK.
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah kematian dan lama rawatan pada kedua tipe eosinofil pasien PPOK eksaserbasi akut, namun kematian hanya pada kelompok non-eosinofilik.
4. Tidak terdapat hubungan antara dosis kortikosteroid dengan luaran pasien PPOK eksaserbasi akut.
5. Tidak terdapat hubungan antara tipe eosinofil dan dosis kortikosteroid dengan luaran pasien PPOK eksaserbasi akut.

7.2 Saran

1. Durasi pengambilan sampel sebaiknya lebih lama sehingga mendapatkan jumlah sampel PPOK eksaserbasi tipe eosinofilik yang lebih banyak agar lebih representatif atau diambil dengan metode *case control* dengan PPOK eksaserbasi tipe eosinofilik sebagai kelompok kasus.
2. Pengambilan sampel sebaiknya diperluas ke rumah sakit sekunder dimana kasus PPOK eksaserbasi akut lebih banyak sehingga banyak sampel yang dapat digunakan.