

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

#### **7.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsi berat di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat diambil kesimpulan :

- 1) Proporsi ibu nulipara di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang terbanyak adalah pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.
- 2) Proporsi Ibu dengan umur beriko di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang terbanyak adalah pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.
- 3) Proporsi ibu dengan riwayat hipertensi di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang terbanyak adalah pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.
- 4) Proporsi ibu dengan riwayat diabetes melitus di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang terbanyak adalah pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.
- 5) Proporsi ibu dengan riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang terbanyak adalah pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.
- 6) Proporsi ibu dengan obesitas di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang terbanyak adalah pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.
- 7) Proporsi ibu dengan kehamilan ganda di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada kelompok kasus sama dengan pada kelompok kontrol.

- 8) Tidak terdapat hubungan antara umur dengan kejadian preeklamsi berat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- 9) Tidak terdapat hubungan antara paritas nulipara dengan kejadian preeklamsi berat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- 10) Terdapat hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsi berat di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Responden dengan riwayat hipertensi berisiko sebesar 13,00 kali untuk mengalami preeklamsi berat.
- 11) Tidak terdapat hubungan antara riwayat diabetes melitus dengan kejadian preeklamsi berat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- 12) Tidak terdapat hubungan antara riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya dengan kejadian preeklamsi berat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- 13) Tidak terdapat hubungan antara obesitas dengan kejadian preeklamsi berat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- 14) Tidak terdapat hubungan antara kehamilan ganda dengan kejadian preeklamsi berat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

## **7.2. Saran**

- 1) Bagi institusi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa kebidanan khususnya, sehingga lulusan mahasiswa kebidanan nantinya dapat mengarahkan masyarakat khususnya para calon ibu tentang pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan dan dapat menjelaskan usia yang aman untuk hamil dan melahirkan.
- 2) Bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang diharapkan agar dapat melakukan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

maupun Dinas Kesehatan Kota Padang, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit Bersalin, dan Praktik Swasta Bidan untuk dapat memberikan penyuluhan tentang preeklamsi terhadap ibu hamil di masing-masing wilayah kerjanya.

- 3) Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain yang berhubungan dengan kejadian preeklamsi seperti adanya penyakit kronis, riwayat abortus dan riwayat merokok.
- 4) Bagi Masyarakat khususnya para calon ibu diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru terhadap ibu yang memiliki riwayat hipertensi agar lebih peduli terhadap kesehatannya dengan melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC ke pelayanan kesehatan sehingga terhindar dari risiko preeklamsi.

