

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan karakteristik ibu dengan tingkat penyembuhan luka perineum yang mendapat terapi PRP di Puskesmas Seberang Padang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik subjek penelitian mayoritas ibu memiliki usia reproduksi normal, hampir seluruhnya memiliki IMT normal, lebih dari separuh adalah multipara, dan hampir seluruhnya mengalami penyembuhan luka perineum yang baik setelah mendapat terapi PRP.
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat penyembuhan luka perineum yang mendapat terapi PRP di Puskesmas Seberang Padang, Kota Padang.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan tingkat penyembuhan luka perineum yang mendapat terapi PRP di Puskesmas Seberang Padang, Kota Padang.
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan tingkat penyembuhan luka perineum yang mendapat terapi PRP di Puskesmas Seberang Padang, Kota Padang.

7.2 Saran

Diharapkan ke depannya terapi Platelet Rich Plasma (PRP) dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan dalam penatalaksanaan penyembuhan luka perineum pada persalinan normal, serta perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan variabel yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.