

SKRIPSI

HUBUNGAN PERILAKU CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS), PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMM- RT) DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

Penelitian Keperawatan Anak



SYELSIN ZAHRA RAMADHANI

2211312047

Pembimbing :

Ns. Ira Mulya Sari, M.Kep., Sp.Kep.An

Ns. Mutia Farlina, M.Kep., Sp.Kep.An

PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

SKRIPSI

HUBUNGAN PERILAKU CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS), PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMM- RT) DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

Penelitian Keperawatan Anak



**SYELSIN ZAHRA RAMADHANI
NIM : 2211312047**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
JANUARI 2026**

SKRIPSI

**HUBUNGAN PERILAKU CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS),
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMM-
RT) DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN**

Penelitian Keperawatan Anak



SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep)
pada Fakultas Keperawatan
Universitas Andalas**

Oleh

**SYELSIN ZAHRA RAMADHANI
NIM : 2211312047**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
JANUARI 2026**

FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
JANUARI 2026

Nama : Syelsin Zahra Ramadhani
NIM : 2211312047

Hubungan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT) dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

ABSTRAK

Diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada balita yang mana menyebabkan sekitar 4.443.832 kematian pada kelompok usia balita setiap tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAMM-RT) dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif analitik dan pendekatan cross-sectional ini melibatkan 105 ibu yang memiliki balita usia 6–24 bulan, dipilih melalui *consecutive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner mengenai CTPS, PAMM-RT, dan riwayat diare balita dalam satu bulan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil balita mengalami diare dalam sebulan terakhir yaitu sebanyak 15 orang (14,3%). Lebih dari separuh responden memiliki perilaku CTPS kategori baik (53,3%) dan PAMM-RT kategori baik (57,1%). Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan bermakna antara perilaku CTPS ($p < 0,001$) dan PAMM-RT ($p = 0,010$) dengan kejadian diare pada balita. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan program promotif dan preventif dengan menekankan pada momen penting dan langkah cuci tangan pakai sabun yang tepat serta praktik pengolahan air minum dan makanan yang aman dalam rumah tangga.

Kata kunci: Balita, CTPS, Diare, PAMM-RT

FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
JANUARY 2026

Name : Syelsin Zahra Ramadhani
Student ID : 2211312047

The Association between Handwashing with Soap Behavior (CTPS), Household Drinking Water and Food Management (PAMM-RT), and the Incidence of Diarrhea among Toddlers in the Working Area of Lubuk Sikaping Primary Health Center, Pasaman Regency

ABSTRACT

Diarrhea is a major cause of morbidity and mortality in toddlers, causing approximately 4,443,832 deaths in the toddler age group each year. This study aims to analyze the relationship between handwashing with soap (CTPS) and household drinking water and food management (PAMM-RT) with the incidence of diarrhea in toddlers in the working area of the Lubuk Sikaping Community Health Center, Pasaman Regency. This quantitative study, with a descriptive analytical design and a cross-sectional approach, involved 105 mothers with toddlers aged 6–24 months, selected through consecutive sampling. Data were collected using a questionnaire regarding CTPS, PAMM-RT, and the toddler's history of diarrhea in the past month. The results showed that a small proportion of toddlers experienced diarrhea in the past month, namely 15 people (14.3%). More than half of the respondents had good CTPS behavior (53.3%) and good PAMM-RT (57.1%). Bivariate analysis showed a significant relationship between CTPS behavior ($p < 0.001$) and PAMM-RT ($p = 0.010$) with the incidence of diarrhea in toddlers. This research is expected to be the basis for developing promotive and preventive programs by emphasizing the important moments and correct steps for washing hands with soap as well as safe drinking water and food processing practices in households.

Keywords: Diarrhea, CTPS, PAMM-RT, Toddler

