

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Karakteristik Klinikohistopatologi Pada Pasien Kanker Buli-buli di Rumah Sakit M. Djamil Padang dari tahun 2020-2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelompok usia pasien yang paling sering terkena kanker buli-buli di Rumah Sakit M. Djamil Padang adalah kelompok usia ≥ 60 tahun.
2. Berdasarkan jenis kelamin, kanker buli-buli lebih sering diidap oleh laki-laki dibandingkan perempuan.
3. Distribusi berdasarkan riwayat merokok tidak dapat diambil kesimpulan karena keterbatasan data rekam medis.
4. Distribusi berdasarkan kejadian hematuria menunjukkan bahwa hematuria terjadi pada Sebagian besar kasus pada pasien kanker buli-buli.
5. Distribusi gejala iritatif menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus mengalami keluhan iritatif seperti disuria, frekuensi, dan urgensi berkemih
6. Distribusi gejala obstruktif menunjukkan bahwa hampir setengah pasien mengalami keluhan obstruksi saluran kemih.
7. Distribusi kedalaman invasif tumor menunjukkan bahwa sebagian besar pasien telah berada pada stadium kanker kandung kemih invasif otot.
8. Tipe histopatologi kanker buli-buli paling sering yaitu *transitional cell carcinoma*.

6.2 Saran

1. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menggunakan desain studi analitik dengan jumlah sampel yang lebih besar dan periode observasi yang lebih panjang. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan pola klinikopatologis kanker buli-buli secara lebih komprehensif, termasuk hubungan antara kedalaman invasif, tipe histopatologi, dan luaran klinis pasien.
2. Disarankan agar penelitian berikutnya memasukkan variabel tambahan seperti stadium klinis, pilihan terapi, dan angka ketahanan hidup pasien. Dengan memasukkan variabel-variabel tersebut, penelitian dapat

memberikan gambaran yang lebih bermakna mengenai perjalanan penyakit, respon terhadap terapi, serta faktor prognostik pada pasien kanker buli-buli.

