

## BAB 6 PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik pasien efusi pleura karena keganasan di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2023-2024, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik epidemiologi pasien efusi pleura karena keganasan terbanyak adalah usia 40–59 tahun, jenis kelamin perempuan, dan bukan perokok.
2. Etiologi pasien efusi pleura karena keganasan terbanyak adalah kanker paru.
3. Karakteristik klinis pasien efusi pleura karena keganasan terbanyak adalah sesak napas, eksudat, hemitoraks dekstra, tidak masif, dan dikategorikan sebagai efusi pleura maligna.

### 6.2 Saran

1. Pasien dengan kanker paru, khususnya pada *staging* lanjut, perlu mendapatkan monitoring berkala untuk mendeteksi efusi pleura lebih awal sehingga intervensi tidak terlambat.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya melibatkan lebih dari satu fasilitas layanan kesehatan atau menggunakan desain *multi-center* agar temuan yang diperoleh memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat menggambarkan variasi karakteristik pasien pada populasi yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain analitik untuk dapat menilai hubungan antarvariabel seperti karakteristik klinis, etiologi keganasan, tipe efusi, dan luaran pasien sehingga dapat dinilai secara lebih terstruktur sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh.
4. Seluruh departemen yang menangani pasien efusi pleura karena keganasan diharapkan meningkatkan kelengkapan dokumentasi status merokok dan interpretasi gambaran foto toraks pasien sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat mendukung analisis yang lebih komprehensif pada penelitian selanjutnya.