

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa itik Peking memiliki bobot hidup 1.672,50 g/ekor dan bobot karkas 1.039,50 g/ekor yang lebih tinggi dibandingkan itik Sikumbang Jonti 1.243,75 g/ekor dan 768,10 g/ekor. Namun, persentase karkas itik Peking 61,88% relatif sama dengan persentase karkas itik Sikumbang Jonti 61,87%. Bobot lemak abdomen itik Peking 12,95 g/ekor lebih tinggi dibandingkan itik Sikumbang Jonti 10,63 g/ekor, namun persentase lemak abdomen itik Peking 0,77% lebih rendah dibandingkan itik Sikumbang Jonti 0,85%. Secara umum itik Peking lebih unggul dibandingkan dengan itik Sikumbang Jonti, namun kedua jenis itik ini memiliki lemak abdomen yang normal.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan parameter yang sama menggunakan itik Sikumbang Jonti generasi pertama (G1) dan itik Peking generasi pertama (G1) dengan umur pemotongan yang berbeda untuk melihat peningkatkan kualitas karkas dan pertumbuhan bobot badan itik Sikumbang Jonti dan Itik Peking yang dipelihara secara intensif di Fakultas Peternakan Universitas Andalas.