

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dari penelitian deskriptif retrospektif yang dilakukan terhadap pasien IMA-EST di Bangsal Jantung RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasien IMA-EST di Bangsal Jantung RSUP Dr. M. Djamil pada tahun 2013-2014 paling banyak berada pada kelompok umur 45-54 tahun, dan berjenis kelamin laki-laki.
2. Faktor risiko yang paling sering ditemui pada pasien IMA-EST adalah hipertensi dan merokok, serta pasien IMA-EST pada umumnya memiliki < 3 faktor risiko.
3. Manajemen reperfusi pada pasien IMA-EST di Bangsal Jantung RSUP Dr. M. Djamil pada tahun 2013-2014 paling banyak dilakukan IKP, namun sebagian besar tindakan IKP tersebut tidak dilakukan dalam 12 jam pasca keluhan pasien. Lain halnya dengan terapi fibrinolitik, semua tindakannya dilakukan dalam 12 jam pasca keluhan pasien.

#### 6.2 Saran

1. Perlu dilakukan studi lebih lanjut terhadap gambaran faktor risiko dan manajemen reperfusi pada pasien IMA-EST dengan subjek penelitian yang lebih luas dan jangka waktu lebih lama sehingga didapatkan hasil yang lebih valid dan representatif.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mendalami bagian manajemen reperfusi, apakah sudah sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh ESC, AHA maupun PERKI.
3. Untuk institusi, perlu dievaluasi ulang manajemen yang seharusnya diterapkan pada pasien IMA-EST di semua sektor, sehingga seluruh pasien IMA-EST mendapatkan terapi yang semestinya.
4. Untuk Bagian Rekam Medik, diharapkan mengevaluasi penyimpanan status/rekam medik pasien sehingga kemungkinan rekam medik hilang tidak akan terjadi lagi

