

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Prevalensi derajat luka perineum tertinggi secara umum adalah derajat II.
2. Penyembuhan luka perineum pada pasien persalinan pervaginam sebagian besar sembuh moderat pada hari ke-7 pasca tatalaksana.
3. Penggunaan *Platelet Rich Plasma* (PRP) memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyembuhan luka perineum pada pasien dengan persalinan pervaginam.

7.2 Saran

1. Dilakukan penelitian dengan seluruh derajat luka dan pertimbangkan ada atau tidak tindakannya tindakan episiotomy, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka.
2. Diharapkan terdapat penelitian lanjutan terhadap penggunaan PRP pada penyembuhan luka perineum pasca persalinan pervaginam dengan cakupan yang lebih luas serta analisis komposisi faktor-faktor yang terkandung dalam PRP sehingga dapat menjadi salah satu dasar tatalaksana luka perineum.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara *multicenter study* agar penelitian memiliki hasil yang bermakna untuk kemajuan ilmu pengetahuan terkait pengaruh PRP pada penyembuhan luka perineum.