

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan pengetahuan dengan kepatuhan perawat dalam penerapan *Bundle Ventilator Associated Pneumonia* (VAP) di ruang ICU RS Universitas Andalas terhadap 25 responden, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Skor pengetahuan perawat mengenai penerapan *Bundle Ventilator Associated Pneumonia* (VAP) secara umum menunjukkan hasil yang tinggi..
2. Skor kepatuhan perawat dalam penerapan *Bundle Ventilator Associated Pneumonia* (VAP) secara umum menunjukkan hasil yang tinggi. Pelaksanaan *Bundle VAP* paling konsisten terdapat pada komponen elevasi kepala tempat tidur 30–45°, pemberian profilaksis *peptic ulcer*, dan profilaksis *deep vein thrombosis* (DVT), sedangkan pengkajian harian sedasi dan kesiapan ekstubasi menunjukkan variasi pelaksanaan yang lebih besar.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan perawat dalam penerapan *Bundle Ventilator Associated Pneumonia* (VAP) di ruang ICU RS Universitas Andalas.
4. Hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan perawat dalam penerapan *Bundle Ventilator Associated Pneumonia* (VAP)

menunjukkan hubungan yang kuat dan positif, yang berarti peningkatan skor pengetahuan perawat diikuti dengan peningkatan skor kepatuhan dalam penerapan *Bundle VAP*.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Rumah sakit diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan penerapan *Bundle VAP* melalui penguatan supervisi klinis, audit kepatuhan, dan evaluasi secara berkala. Rumah sakit juga disarankan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan *Bundle VAP* serta Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) secara berkelanjutan, terutama terkait pembaruan SOP dan pedoman dalam pencegahan VAP.

2. Bagi Perawat

Perawat diharapkan meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan setiap komponen *Bundle VAP*, terutama pada aspek yang masih menunjukkan hasil pengetahuan yang lebih rendah, seperti profilaksis *stress ulcer*, penggunaan tabung endotrakeal dengan drainase subglotik, dan penggunaan sarung tangan steril saat *suction*. Perawat juga diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mengenai *Bundle VAP* melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pembelajaran mandiri, seminar, *case review*, *case-based learning*, serta mengikuti pembaruan pedoman dan SOP terkait pencegahan VAP untuk mendukung konsistensi penerapan *Bundle VAP* di ruang ICU.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan beberapa rumah sakit agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji faktor lain yang berhubungan dengan kepatuhan dalam penerapan *Bundle VAP*, seperti motivasi, sikap, beban kerja, supervisi, budaya keselamatan pasien, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

