

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemberian beberapa dosis pupuk bokashi kotoran ayam mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter tajuk, bobot segar tanaman, dan bobot segar tajuk tanaman sawi pagoda. Bokashi belum mampu meningkatkan lebar daun terlebar, luas daun, bobot segar akar, volume akar, bobot kering akar, dan rasio tajuk akar. Dosis 15 ton/ha atau 37,5 g/polybag dapat dinyatakan sebagai dosis efektif yang digunakan karena telah mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pagoda serta memberikan respons yang sama dengan dosis yang lebih tinggi pada beberapa parameter utama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, penggunaan bokashi kotoran ayam dosis 15 ton/ha atau 37,5 g/polybag dapat disarankan sebagai dosis efektif untuk budidaya sawi pagoda dalam polybag. Penelitian lanjutan disarankan dilakukan pada skala lapangan dan mempertimbangkan efisiensi ekonomi penggunaan bokashi.

