

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

1. Tidak ada perbedaan rerata kadar Zinc serum antara ketuban pecah dini aterm dan kehamilan normal
2. Ada perbedaan rerata kadar MMP-9 serum antara ketuban pecah dini aterm dan kehamilan normal

#### **7.2 Saran**

1. Bagi Praktisi di Pelayanan Kesehatan
  - a. Perlu adanya pemeriksaan dengan menggunakan serum MMP-9 yang dapat digunakan sebagai parameter untuk membantu diagnostik ketuban pecah dini
  - b. Agar lebih menggali informasi secara komprehensif mengenai riwayat kesehatan ibu hamil yang berimplikasi pada kejadian komplikasi selama kehamilan seperti terjadinya KPD agar komplikasi tersebut dapat dicegah secara dini.
2. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya
  - a. Agar melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejadian KPD pada Ibu Hamil seperti riwayat kesehatan ibu (perdarahan antepartum, riwayat persalinan preterm, riwayat intervensi pada saluran reproduksi ibu)
  - b. Agar peneliti selanjutnya memperhatikan rentang waktu pengambilan sampel dan tidak melihat adanya tanda-tanda persalinan, karena beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan kadar MMP-9