

**HUBUNGAN KEKUATAN KARAKTER DENGAN DERAJAT SINDROM
DISPEPSIA PADA PENDERITA SINDROM DISPEPSIA YANG
BERETNIS MINANGKABAU DI PUSKESMAS ANDALAS**



Skripsi

Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Pemenuhan Salah
Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh

Mohammad Fauzan

No.BP. 1610312019

PEMBIMBING:

dr. Taufik Ashal, Sp.KJ

Dr.dr. Arina Widya Murni, SpPD-KPsi, FINASIM

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019

**RELATION BETWEEN LEVEL OF CHARACTER STRENGTH WITH
THE DEGREE OF DYSPEPSIA SYNDROME ON MINANGKABAU
ETHNIC AT ANDALAS PUBLIC HEALTH CENTER**

By

Mohammad Fauzan


ABSTRACT

The incidence of dyspepsia syndrome is still high in West Sumatra, were the majority of the population is Minangkabau ethnic. Stress is one of the factors that influence the incidence of dyspepsia syndrome. Stress is closely related to the strength of character. This research aim to know the co-relation between the level of character strength with the degree of dyspepsia syndrome on patients with dyspepsia who are ethnically Minangkabau in Andalas Public Health Center.

This research is analytical research with cross-sectional design and was done at Andalas Public Health Center. The sampling technique that was used is Consecutive non-probability sampling and total sample of 35. The data collection was done using a scale of character strength to determine the level of character strength and dyspepsia score guideline to determine the degree of dyspepsia syndrome. After the data was obtained, the analysis was done using Fisher exact test.

It was obtained that, many patient with dyspepsia syndrome have a medium-high level of character strengths (77.1%), while looking at the stage of dyspepsia syndrome, it was obtained that most patient with mild degree of dyspepsia syndrome have medium-high level of character strengths (95.6%). Patients with medium-severe degree of dyspepsia syndrome have low level of character strength (58,4%). Based on Fisher exact test, was obtained the value of $p = 0.001$, so character strength was significantly related to the degree of syndrome on Minangkabau ethnic at Andalas Public Health Center.

Keywords: *character strength, dyspepsia syndrome, Minangkabau ethnic*



HUBUNGAN KEKUATAN KARAKTER DENGAN DERAJAT SINDROM DISPEPSIA PADA PENDERITA SINDROM DISPEPSIA YANG BERETNIS MINANGKABAU DI PUSKEMAS ANDALAS

Oleh

Mohammad Fauzan

ABSTRAK

Insiden sindrom dispepsia masih tinggi di Sumatera Barat yang mayoritas masyarakatnya beretnis Minangkabau. Stres merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian sindrom dispepsia. Stres erat kaitannya dengan kekuatan karakter. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan kekuatan karakter dengan derajat sindrom dispepsia pada penderita sindrom dispepsia yang beretnis Minangkabau di Puskesmas Andalas

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan *cross sectional design* yang dilakukan di Puskesmas Andalas. Teknik pengambilan sampel dengan dengan *consecutive sampling non probability* dan jumlah sampel 35 orang. Pengumpulan data menggunakan skala kekuatan karakter untuk menentukan tingkat kekuatan karakter dan pedoman skor dispepsia untuk menentukan derajat sindrom dispepsia. Setelah didapatkan data dilakukan analisis dengan menggunakan uji *Fisher exact test*.

Didapatkan penderita sindrom dispepsia sebagian besar memiliki kekuatan karakter tingkat sedang-tinggi (77,1%), sedangkan dilihat dari derajat sindrom dispepsia didapatkan penderita sindrom dispepsia derajat ringan sebagian besar mempunyai kekuatan karakter tingkat sedang-tinggi (95,6%). Penderita sindrom dispepsia derajat sedang-berat sebagian besar mempunyai kekuatan karakter tingkat rendah (58,4%). Berdasarkan uji *Fisher* didapatkan nilai *p value* = 0,001 sehingga kekuatan karakter berhubungan secara signifikan dengan derajat sindrom dispepsia pada penderita sindrom dispepsia yang beretnis Minangkabau di Puskesmas Andalas.

Kata Kunci: kekuatan karakter, sindrom dispepsia, etnis Minangkabau

